



Įvykio vietoje:



Pirmame stacionare:

- A kvėpavimo takų praeinamumo įvertinimas ir užtikrinimas ir tuo pat metu stuburo kaklinės dalies imobilizavimas kieta apykakle.
- B kvėpavimo įvertinimas ir užtikrinimas.
- C cirkuliacijos įvertinimas ir užtikrinimas.
- D neurologinės būklės įvertinimas pagal Glasgow komų skalę (GKS) vyzdžių dydis, simetrija ir reakcija į šviesą.



Skambutis, ne vėliau kaip per 30 min., į III lygio ligoninę ar ligoninę, kurioje yra 24 val. veikiantis KT ir neurochirurgo postas.

Optimalūs rodikliai

- $\text{PaO}_2 \geq 100$ mm Hg, PaCO_2 30–40 mm Hg, $\text{SpO}_2 > 95$ proc.;
- AKS ne žemesnis nei apatinė sistolinio spaudimo normos riba ($80+2 \times \text{amžius m.}$);
- Hb ne mažiau kaip 100 g/l;
- Na^+ ne mažiau kaip 140 mmol/l;
- normoglikemija;
- normotermija;
- diurezė ne mažesnė nei 1 ml/kg/val.

Pasirinktini medikamentai

- midazolamas 0,1–0,4 mg/kg arba diazepam 0,1–0,4 mg/kg, arba tiopentalis 2–5 mg/kg (gali sąlygoti hipotenziją), arba kt.
- morfinas 0,1–0,2 mg/kg arba fentanilis 1–2 $\mu\text{g/kg}$, arba kt.
- listenonas (*suxamethonium*) 1–2 mg/kg arba arduanas (*pipecuronium bromide*) 0,1 mg/kg, arba tracriumas (*atracurii besilas*) 0,3–0,6 mg/kg, arba kt.